

Echelle de dépistage de la dépression dans l'épilepsie Echelle NDDI-E

<p style="text-align: center;">Date du jour :</p> <p style="text-align: center;"> jour mois année </p>	<p style="text-align: center;">Numéro de la visite :</p> <p style="text-align: center;"> </p>
<p style="text-align: center;">Numéro d'identification du patient :</p> <p>_____</p>	<p style="text-align: center;">Sexe :</p> <p><input type="checkbox"/> Masculin</p> <p><input type="checkbox"/> Féminin</p>

Durant les 2 dernières semaines, y a-t-il eu des moments où :
(Entourez un seul chiffre par ligne)

	Jamais	Rarement	Parfois	Toujours ou souvent
Tout est une lutte	1	2	3	4
Rien de ce que je fais n'est bien	1	2	3	4
Je me sens coupable	1	2	3	4
Je ferais mieux d'être mort(e)	1	2	3	4
Je me sens frustré(e)	1	2	3	4
J'ai des difficultés à trouver du plaisir	1	2	3	4

SCORE TOTAL :

L'échelle *Neurological Disorders Depression Inventory for Epilepsy* (NDDI-E)¹, version Française², est une échelle validée de dépistage des épisodes dépressifs majeurs (caractérisés) chez les patients avec une épilepsie.

Il s'agit d'un auto-questionnaire (rempli par le patient).

Le score total s'obtient en additionnant le score obtenu à chaque item.

Un score total supérieur strictement à 15 doit faire suspecter un épisode dépressif majeur.

La NDDI-E n'est pas une échelle de diagnostic de l'épisode dépressif majeur ni une échelle de sévérité de l'épisode. Il s'agit d'une échelle de dépistage. Si le score est > à 15, il est donc conseillé de faire confirmer le diagnostic par une évaluation clinique psychiatrique.

¹ Gilliam et al., *The Lancet Neurology*, 2006

² Micoulaud-Franchi et al., *Epilepsy and Behavior*, 2015